



Kornelkirsche

(*Cornus mas*)

Frucht: VIII - IX

Halbschatten, trocken

Als Heckenstrauch

geeignet.

Frühblüher

(Bienenweide)

Berberitze

(*Beberis vulgaris*)

Frucht: ab VII

Sonne bis halbschattig

Frühblüher

(Bienenweide)



Pfaffenhütchen

(*Euonymus europaeus*)

Frucht: IX – XI

Halbschatten, mittel-

feucht

Für Säugetiere giftig!

Wird von 24 Vogelarten

besucht

Roter Hartriegel

(*Cornus sanguinea*)

Frucht: VII- IX

Sonne bis halbschattig,

trocken

Wird von 24 Vogelarten

besucht, auch **Bienen-**

weide



Liguster

(*Ligustrum vulgare*)

Frucht: VIII – X

Halbschatten, mittel-

feucht

Wird von 21 Vogelarten

besucht, als Hecken-

strauch geeignet

Eberesche / Vogelbeere

(*Sorbus aucuparia*)

Frucht: VIII – X

Sonne bis halbschattig

Wird von 63 Vogel- und

72 Insektenarten

(davon 42 **Schmetter-**

lingsarten) besucht



Schwarzer Holunder

(*Sambucus nigra*)

Frucht: VIII – IX

Halbschatten, feucht

Beeren gekocht essbar,

wird von 62 Vogelarten

besucht

Schwarzdorn / Schlehe

(*Prunus spinosa*)

Frucht: IX - XI

Sonne, trocken

Wird von 20 Vogel-, 73

Schmetterlings- und 20

Wildbienenarten

besucht





Rote Heckenkirsche
(Lonicera xylosteum)
 Frucht: VII – IX
 Sonne bis Schatten,
 Als Hecke geeignet.
 Beeren für Menschen
 giftig
 Wird von 8 Vogelarten
 besucht; Hummelweide

Wildrose /Hundsrose
(Rosa canina)
 Frucht: X – XII
 Sonnig, trocken.
 Wird von 27 Vogel-
 und 31 Schmetter-
 lingsarten besucht



Sanddorn
(Hippophae rhamnoides)
 Frucht: ab VIII
 Sonniger Standort
 Beeren genießbar.
 Wird von 16 Vogelarten
 besucht.

Gemeiner Schneeball
(Viburnum opulus)
 Frucht: ab VIII
 Sonne bis Schatten
 Die Pflanze ist giftig.
 Wird von 15 Vogelarten
 besucht



Weißdorn
 Eingriffeliger Weißdorn
(Crataegus monogyna)
 Frucht: VII - IX
 Sonne bis Halbschat-
 ten, trocken.
 Wird von 32 Vogel- und
 56 Kleinschmetter-
 lingsarten besucht.
Bienenweide

Wilde Brombeere
(Rubus fruticosus)
 Frucht: ab VIII
 Sonne bis Halbschat-
 ten, anspruchslos.
 Wird von 32 Vogel-
 und 32 Kleinschmet-
 terlingsarten besucht.



Efeu
(Hedera helix)
 Frucht: II – IV
 Schattig, mittelfeucht
 Anspruchslose Kletter-
 pflanze.
 Späte Vogelernahrung

Wolliger Schneeball
(Viburnum lantana)
 Frucht: ab VIII
 Sonne bis Halb-
 schatten, trocken,
 Blüht ab Mai
 (Bienenweide)
 Früchte zunächst rot,
 werden bei Reifung
 schwarz



Ungeeignet als Beerensträucher für Vögel sind:
 Chinesischer Wacholder, Kirschlorbeer, Thuja, Forsythien, Sommerflieder, Scharlachdorn und Zuchtrosen